

Oversigt

Zero 2% larvicide mod fluelarver, 25 kg.

Varenummer: 481066



Pris

Priser er ekskl. moms dertil kommer fragt

Beskrivelse

ZERO® anvendes til bekæmpelse af fluelarver (herunder rottehalerlarver) i gødning, strøelse, gødning og gyllebeholdere eller flydende gødning. Det indeholder et vækstforstyrrende middel, der virker specifikt mod alle fluelarver og har ingen virkning på voksne fluer. ZERO® består af et vandopløseligt granulat: 20 g/kg cyromazin (2 %). Anvendelsesområde og dosering: Afhængigt af vandindholdet i det materiale, der skal behandles, er der følgende anvendelsesmuligheder: • Udbringning af granulatet direkte på overfladen (250 g pr. 10 m²) • Sprøjtning (250 g til 10 m² i 1 til 4 l vand) • Vanding (250 g til 10 m² i 4 -10 l vand). Gentag behandlingen ca. hver 6. uge, eller så snart det sidst behandlede lag er dækket af ca. 10 cm, eller der observeres en genkomst af fluelarver. EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE: ZERO® anvendes overalt, hvor fluelarver kan udvikle sig: • I kvæg-, kalve- og hestestalde behandles ca. 50 cm brede, dybe strøelseskantområder langs væggene, ved siden af og under installationer med vandingsdåsen eller med rygsprøjten. Hvis der er tale om flydende gødning, kan ZERO® spredes direkte. • Den første behandling bør foretages ca. 1-3 dage efter, at gødningen er fjernet. • I kvægstalde med spaltegulve skal hele gulvarealet drysses jævnt med ZERO®. • I svinestalde med fuld spaltegulv skal hele området behandles, i tilfælde af delvis spaltegulv hele spalteområdet samt kantområderne i liggeområderne. • Det er tilrådeligt at anvende før opstaldning eller efter fjernelse af gødning eller dræning. • I hønsestalde med en gødningsgrav skal granulatet spredes tørt, hvis gødningen er fugtig eller flydende; hvis gødningen er tør, skal produktet udbringes med en vandkande eller en tryksprøjte. Behandl hele gødningsområdet første gang ca. 1 uge efter fjernelse af gødningen, men før et gødningsdækket er 10 cm. tykt. Pose med 25 kg.